

Myocastor coypus dit « le RAGONDIN »

Le **Ragondin** (*Myocastor coypus*), est une espèce de rongeurs à répartition cosmopolite, appartenant à la famille des Echimyidae¹ ou « rats épineux », quand il n'est pas encore classé à part dans la famille des Myocastoridae².

Ce gros mammifère semi-aquatique, originaire d'Amérique du Sud, s'est naturalisé en Asie, en Afrique orientale, en Amérique du Nord, en Europe au xix^e siècle pour l'exploitation de sa fouurrure bon marché³. Tous les individus présents dans ces régions proviennent à l'origine d'évasions ou de lâchers volontaires.

En Europe, le ragondin est inscrit depuis 2016 dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne⁴. Cela signifie que cette espèce ne peut pas être importée, élevée, transportée, commercialisée, ou libérée intentionnellement dans la nature, et ce nulle part dans l'Union européenne⁵.

- Poids moyen : 5-9 kg, en moyenne 7 kg
- Taille : un corps de 40 à 60 cm et une queue de 25 à 45 cm.

De mœurs à tendance crépusculaire et nocturne, il peut avoir une activité diurne non négligeable.

Présent dans seulement quelques départements français lors de son introduction, il est désormais présent dans plus de 70 départements. Il a colonisé des régions telles que le marais Poitevin, la Camarque ou les Landes dans une moindre mesure. Il est maintenant présent dans les régions du Sud de la France (Lot-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Aude, Gard, Hérault, Tarn, Haute-Garonne, Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône...) mais on le trouve également dans certaines régions plus au nord : la Normandie (marais du Cotentin, vallée de la Seine), l'Île-de-France (canal de l'Ourcq, étangs de Vélizy¹⁵, parc du Château de Versailles - Hameau de la Reine), le Centre et le Grand-Est, il est très présent en Meuse, Haute-Saône, Alsace, Saône-et-Loire notamment.

Le froid est un facteur limitant et les hivers rigoureux lui sont fatals. L'organisme du ragondin n'est pas adapté au gel comme celui du castor. Lors d'hivers rigoureux, de nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère en gangrène mortelle.

Le ragondin est reconnaissable à ses quatre grandes incisives rouge-orange.

Il est plus gros que le rat musqué et sa queue a une section plus ovale. Sa queue se différencie de celle des castors, qui ont une large queue plate.

La présence en nombre du ragondin limite la croissance des rats musqués, réputés plus nocifs que les ragondins.



Museau de ragondin vu de face.



La queue est cylindrique.



Crâne de ragondin.



Ses dents de couleur orange sont très visibles.

Habitat

Le ragondin est un animal préférant vivre dans les milieux aquatiques d'[eau douce](#), parfois saumâtre. Aux rivières et fleuves d'Amérique du Sud d'où il provient s'ajoutent désormais tous les réseaux hydrauliques constituant son nouvel habitat dans les pays où il a été introduit : fossés et canaux reliant les marais.

Il creuse un [terrier](#) de 6 à 7 m le long des berges. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique. Dans certaines régions à très forte densité de ragondins, et lorsqu'il a à sa disposition un vaste réseau de fossés et canaux, les terriers du ragondin participent à la déstabilisation des [berges](#). Par la quantité de terre exportée dans l'eau à chaque terrier creusé, le ragondin provoque également l'accélération du comblement des fossés et canaux. Il arrive qu'il utilise les terriers déjà creusés par le [rat musqué](#), avec qui il entre en concurrence. Il peut également construire des huttes de feuillages.



Régime alimentaire

Rongeur [herbivore](#), son régime est normalement constitué de céréales, de racines, d'herbes, de glands ou autres. Néanmoins, il s'adapte très vite aux ressources disponibles sur son territoire. Il consomme ainsi une grande quantité de [Poacées](#), notamment des [céréales](#) comme le [maïs](#) et le [blé](#). Majoritairement herbivore, le ragondin peut toutefois manger des [moules d'eau douce](#) et des [écrevisses](#).

Reproduction

Dans son habitat naturel, le ragondin atteint sa [maturité sexuelle](#) vers six mois, mais est mature dès deux à quatre mois en captivité. Les mâles sont actifs sexuellement toute l'année. La femelle a deux ou trois portées par an de cinq ou sept petits en moyenne. Elle les allaite pendant sept à huit semaines. Fait particulier, ses [mamelles](#) sont déportées vers les flancs au lieu d'être placées sous le ventre comme chez la plupart des mammifères, ce qui lui permet de nager avec ses petits accrochés aux tétines.

Prédateurs

Dans leur environnement d'origine, les populations de ragondins sont régulées naturellement par leurs [prédateurs](#), comme les [caïmans](#) et le [puma](#).

Dans les pays où il a été introduit, le ragondin n'a aucun prédateur naturel, tout du moins à l'état adulte. Les jeunes ragondins sont parfois les proies de mammifères prédateurs comme la [fouine](#), le [renard](#), ou des oiseaux comme le [busard des roseaux](#), la [buse variable](#) et la [chouette effraie](#).

Il est accusé en particulier de :

- dégradation et mise à nu des berges favorisant leur érosion progressive ;
- fragilisation des fondations d'ouvrages hydrauliques¹⁷ par le réseau de galeries ;
- dégâts causés aux cultures ([céréales](#), [maraîchage](#), écorçage dans les [peupleraies](#)...) ;
- menace sur certaines espèces végétales (surtout aquatiques) à cause d'une surconsommation ;
- destruction des nids d'oiseaux aquatiques ;
- possibilité de transmission de maladies telles que la [douve du foie](#) ou la [leptospirose](#).

En [France](#), il est inscrit officiellement sur la [liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles](#).

Leptospirose

Le ragondin est porteur d'une bactérie provoquant une maladie mortelle qui s'appelle la [leptospirose](#)

Outre sa chasse en tant que [nuisible](#), le ragondin peut être chassé ou bien élevé pour la peau et la viande, sous réserve de détenir le [certificat de capacité](#) correspondant au même titre par exemple qu'un élevage de [biches](#) ou de [sangliers](#).

Au [XIX^e siècle](#), sa fourrure était utilisée mais a rencontré peu de succès

Régulable par les piégeurs à jour de leur cotisation

- Boite à fauve



- Pièges en X,




- Boites spéciale ragondin



Chassable par tout type d'arme homologuées durant les dates d'ouverture de la chasse.

Pour ce qui nous intéresse, à l'arc toute l'année sous condition d'avoir une convention avec le propriétaire, ou la collectivité local, entreprise etc.

Aussi bien a l'arc mécanique, que traditionnel, puissance minimale de 45 #.



Flèche :

- Carbone,
- Bois,
- Alu,
- Mixte (alu/carbone)

Empennage suivant les goûts,



- En 3 ou 4 vanes,




- Naturelles, ou synthétique,



- Droites ou avec un offset



Différents types de lames ou assommoirs selon les goûts



Bow Tuning - Groupement des lames de chasse et poi...
bowtuning.fr



Lame de chasse mécanique articu...
erhart-sports.com · En stock



Lames mécaniques - Tir et chas...
lx-archerie.fr



Lames mécaniques - Tir et chasse à l'arc
lx-archerie.fr



Pointe Chasse mécanique WASP D...
archeriemania.com · En stock



Lames mécaniques - Tir et cha...
lx-archerie.fr



Pointe de chasse mécanique t...
the-hunting-shop.com · En stock



Lame Mécanique Hybride DRT Nap gear BMF - Lam...
archeriemania.com · Non disponible



Rages Bilame standard 100 g...
lx-archerie.fr · En stock



RAGE X-Treme Pointe de chas...
the-hunting-shop.com





Pointe chasse - Bourgogne Ar...
bourgognearcherie.com


Maintenant parlons terrain :

Le rag comme on l'appelle, est un animal timide, facile et très difficile à chasser, assez lunatique, il apprend très vite, sur un terrain non exploité vous pouvez en prélever 2 / 4 / 10 / 20très rapidement, mais la sortie suivante vous en verrez, mais de plus en plus difficile à approcher, c'est pourquoi il faut avoir plusieurs terrains de jeux afin de pouvoir espacer les sorties et éviter de mettre trop de pression.

C'est un gibier(**oui** je dis bien gibier qui est aussi honorable que le chevreuil, renard, sangliers.**il mérite votre respect**).qui est un très bon compagnon de jeux, il vous éduquera et vous obligera à travailler vos approches ainsi que votre invisibilité, et surtout votre armement et décochage.

Pensez à vous équiper d'un sac à dos avec du gel hydro-alcoolique, de gants à usage unique (maladie), d'un bon couteau, cordelettes, PQ, et un petit lancer télescopique avec 150m de tresse 80/100 dans le moulinet et terminé par un grappin (fait avec de la corde à piano et un corps flottant, surtout pas de rapala ,

cuillère  ou autres engins de pêche, c'est interdit sous peine de pêche illicite ou braconnage) afin de pouvoir ramener vos prises lorsqu'elles ne sont pas accessibles de la berge.

Une autre technique est aussi intéressante, la pratique en float-tube  mais avec un arc trad très court ou mécanique de petite puissance pas au-dessus de 45/50 #, n'oubliez pas que vous êtes dans l'eau sans aucun appui. Vous les approchez sans bruit entre 1/5 m

Donc voici ma modeste contribution sans prétention, pour ceux qui voudraient essayer ce type de chasse.

Le ragondin est un animal incroyable, qui vous procurera beaucoup de satisfaction, de déboire aussi mais surtout de l'expérience.

Pour ceux qui le veulent je reste à votre disposition, sachant qu'il y a d'autres chasseurs avec beaucoup d'expérience, qui pourront aussi vous aider.

« Que Saint HUBERT soit toujours à vos côtés »

Philippe